

27-09-2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Σας απαντούμε στα σχόλια των εταιρειών προκειμένου να γίνει η 2^η ανάρτηση .

NUTRICIA

Τα σχόλια της NUTRICIA για τα βρεφικά γάλατα γίνονται αποδεκτά.

CANA

A. Προδιαγραφές εντερικών διαλυμάτων παιδιών

20: έχει καλυφθεί από το 18

21:να προστεθεί

22:όχι γιατί θα προτιμηθεί το 24 που μπορεί να ληφθεί και από το στόμα

23:έχει καλυφθεί από το 17

24:να προστεθεί

25:περιττό

B. Εντερικά διαλύματα Ενηλίκων Από το στόμα

12:δεν αφορά στον τρέχοντα διαγωνισμό

13:να προστεθεί

Γ. Εντερικά διαλύματα Ενηλίκων μέσω καθετήρα/στομίας

9:έχει καλυφθεί από το 3 και εφ'όσον

10:δεν χρειαζόμαστε σάκους 1.5 λίτρων

ABBOTT

Προδιαγραφές εντερικών διαλυμάτων παιδιών

15:όχι στο 1 επειδή δεν είναι εύχρηστο,

όχι στο 2 εφ'όσον ανεβάζει το κόστος

16:όχι στο 1 επειδή δεν είναι εύχρηστο,

όχι στο 2 εφ'όσον ανεβάζει το κόστος

19:όχι εφ'όσον ανεβάζει το κόστος.

Εντερικά διαλύματα Ενηλίκων Από το στόμα

6:όχι για το 1 και το 3, μια που είναι απαράδεκτα γιατί μας υπαγορεύουν άλλο από αυτό που ζητάμε.

Για το 2 να σβηστεί το ≤ 280 mOsm/l αλλά να παραμείνει η χαμηλή ωσμωτικότητα.

8:ΟΧΙ γιατί μας υποδεικνύουν άλλο σκεύασμα από αυτό που ζητάμε.

9:Να προστεθεί μετά το φυτικές ίνες...**ΚΑΙ/Η ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ.**

Εντερικά διαλύματα Ενηλίκων μέσω καθετήρα/στομίας

1: ΟΧΙ γιατί περιγράφει

2: ΟΧΙ γιατί περιγράφει

3: ΟΧΙ γιατί περιγράφει

4: ΟΧΙ γιατί περιγράφει

5: Να προστεθεί μετά το φυτικές ίνες... **ΚΑΙ/Η ΜΕ ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ.**

6: Να μη σβηστεί το ≤ 230 mOsm/l ισχύει η χαμηλή ωσμωτικότητα,. Να σβηστεί το (όχι πάνω από 4 γρ/100ml) και τίποτε άλλο

7: Να σβηστεί ≤ 300 mOsm/l και τίποτε άλλο .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης γνωστοποίησης από τον ΕΟΦ για τα διαιτητικά τρόφιμα, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 της υπ'αρθ. Υ3/3211/27.9.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 'Β 1185), 'ο θέτων σε κυκλοφορία διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς γνωστοποιεί συγχρόνως στον ΕΟΦ την επισήμανση, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, την παρουσίαση, τον παρασκευαστή του προϊόντος, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, επιστημονικά στοιχεία ικανά να τεκμηριώσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για την προτεινόμενη χρήση'. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται βεβαίωσης γνωστοποίησης από τον ΕΟΦ το προϊόν θα απορρίπτεται.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ'αρθ. Υ3/3211/27.9.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 'Β 1185) το κάθε προσφερόμενο προϊόν-διαιτητικό τρόφιμο θα πρέπει στη συσκευασία του να αναγράφει την ενεργειακή αξία, την μέση ποσότητα κάθε ανόργανης ουσίας, βιταμίνης και θρεπτικής ύλης που περιέχει, την ωσμοτικότητα, πληροφορίες και ενδείξεις (ασθένεια, διαταραχή ή παθολογική κατάσταση) οι οποίες και θα αναγράφονται με ευκρίνεια στη συσκευασία τους όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 2,3,4,5 του παραπάνω νόμου
3. Να αναγράφεται στην προσφορά το βάρος και ο όγκος ανά τεμάχιο προσφερόμενου προϊόντος, αν είναι σε μορφή σκόνης ή υγρή μορφή αντίστοιχα, ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια η χαμηλότερη τιμή.

4.Σύμφωνα με τις παρακάτω Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN)

ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults. Clinical Nutrition 35 (2016) 247e307

ESPEN endorsed recommendations: Nutritional therapy in major burns. Clinical Nutrition 32 (2013) 497-502

Guidelines for perioperative care for pancreaticoduodenectomy: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations, International Association for Surgical Metabolism and Nutrition (IASMEN) and European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). Clinical Nutrition 31 (2012) 817-830

Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations. Clinical Nutrition 31 (2012) 801-816

Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations. Clinical Nutrition 31 (2012) 783-800

ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition. Clinical Nutrition 2006;25:177-360

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

1. ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ
2. ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ
3. ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ
4. ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΤΡΙΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ
5. ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝΝ
6. ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝΝ
7. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
8. ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
9. ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ 100% ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΜΕΧΡΙ 1 ΕΤΟΥΣ
10. ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ 100% ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ

- 11.ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΤΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΑΚΤΟΖΗ.
- 12.ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΤΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΑΚΤΟΖΗ
- 13.ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ ΜΕ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΑΛΥΣΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
- 14.ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΤΟΙΜΟ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΟΓΚΟ ΤΡΟΦΗΣ (ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ, ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π)
- 15.ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΤΟΙΜΟ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
- 16.ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΨΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
- 17.ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΜΙΓΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

18. ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΚΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΚΤΟΖΗΣ, ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΟΜΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

19. ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΚΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΚΤΟΖΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΟΜΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ .

20. ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ TGF- β 2, ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CROWN.

21. ΠΛΗΡΕΣ ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ $\leq 4\text{GR}/100\text{ML}$, ΣΕ
ΜΟΡΦΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
ΜΕΣΗΣ ΑΛΥΣΟΥ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ,
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ.

22. BIBERON ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 ml
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΑΝΑ 5 ml ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΘΗΛΕΣ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ

23. BIBERON ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 250 ml
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΑΝΑ 5 ml ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΘΗΛΕΣ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ.

ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

1. Πόσιμο ισοθερμιδικό (1 kcal/ ml) πολυμερές συμπλήρωμα διατροφής χωρίς υπόλειμμα, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος, χαμηλής ωσμωτικότητας, ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης, διαφόρων γεύσεων, για ασθενείς χωρίς μεταβολικές διαταραχές ή για έναρξη εντερικής σίτισης,.
2. Πόσιμο υπερθερμιδικό (>1kcal/ ml) και υπερπρωτεϊνικό πολυμερές συμπλήρωμα διατροφής με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο γλουτένης, λακτόζης, διαφόρων γεύσεων.
3. Πόσιμο υπερθερμιδικό (2 Kcal/ml), πολυμερές συμπλήρωμα διατροφής, χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρά, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος (35-40% της ενέργειας), με υψηλό ποσοστό φυτικών ινών.
4. Πόσιμο υπερθερμιδικό, υπερπρωτεϊνικό, πολυμερές συμπλήρωμα, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες με υδατάνθρακες βραδείας απορρόφησης, χαμηλό σε ηλεκτρολύτες (K, P, Mg) και βιταμίνη A και D, υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες B, με ιχθυέλαια, FOS, MUFA, κατάλληλο και για χορήγηση μέσω καθετήρα, για ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.
5. Πόσιμο πλήρες, πολυμερές διάλυμα εντερικής διατροφής με αντιφλεγμονώδη παράγοντα TGF-b2, χαμηλής ωσμωτικότητας (<330mOsm/l) υψηλής περιεκτικότητας σε ω-3, ω-6 λιπαρά οξέα, χωρίς προσθήκη γλουταμίνης, αργινίνης, για ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.
6. Πόσιμο ισοθερμιδικό πεπτιδικό (ημιστοιχειακό) διάλυμα εντερικής διατροφής σε υγρή μορφή, χαμηλής ωσμωτικότητας, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's, (τουλάχιστον 65% του συνόλου του λίπους) και χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, για ασθενείς με δυσαπορρόφηση και μειωμένη νεφρική λειτουργία.
7. Πόσιμο στοιχειακή διατροφή για χορήγηση από το στόμα με 100% ελεύθερα αμινοξέα, θρεπτικά πλήρης με λίπος εκ του οποίου 35% σε μορφή MCT και ελεύθερο γλουτένης.
8. Πόσιμα υπερθερμιδικά (>1kcal/ml), πολυμερή διαλύματα εμπλουτισμένα με διακλαδισμένης αλυσού αμινοξέα, για ασθενείς με ηπατοπάθεια,.

9. Πόσιμα πολυμερή υπερθερμιδικά (>1kcal/ml) και υπερπρωτεϊνικά (100g/l) διαλύματα πλούσια σε λίπος με MCT και εικοσιπεντανοϊκό οξύ (0,5g/100ml) , εμπλουτισμένα με αντιοξειδωτικά, με φυτικές ίνες ή **ΚΑΙ/Η ΜΕ ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ** για ογκολογικούς ασθενείς.
10. Ειδικό σκεύασμα υδατανθράκων, που μετατρέπει την υγρή τροφή σε πολτώδη για σίτιση ασθενών με δυσκαταποσία.
11. Ειδικό σκεύασμα πολύ υψηλής περιεκτικότητας πρωτεΐνης σε σκόνη (>90gr. πρωτεΐνης ανά 100g προϊόντος), χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος (κάτω από 1,5gr. λίπους ανά 100gr. προϊόντος), για δίαιτα με υψηλές πρωτεϊνικές απαιτήσεις.
12. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων η/και χρόνιων τραυμάτων με αργινίνη, γλουταμίνη και HMB (beta-hydroxy-beta-methylbutyrate) που επάγει την πρωτεϊνολύση για μετεγχειρητικούς ασθενείς ή με κατακλίσεις ή εγκαύματα.
13. Πόσιμο πλήρες, πολυμερές συμπλήρωμα ανοσοδιατροφής, υπερθερμιδικό>1,3kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, με αργινίνη τουλάχιστον 1,5g/100ml, ιχθυέλαια, νουκλεοτίδια, χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος, για περιεγχειρητικούς ασθενείς, πριν και μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις.

ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ/ΣΤΟΜΙΑΣ

1. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με 1 kcal/ml, χωρίς υπόλειμμα, με χαμηλή ωσμωτικότητα, ελεύθερα γλουτένης, λακτόζης. Να περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά και ιχθυέλαια για ασθενείς χωρίς μεταβολικές διαταραχές ή έναρξη σίτισης, μέσω καθετήρα/στομίας.
2. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής, υπερθερμιδικά (1,5 kcal/ ml), με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ελεύθερα γλουτένης και λακτόζης. Να περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά, MCT και ιχθυέλαια, μέσω καθετήρα/στομίας..
3. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με υψηλή θερμιδική αξία (1,5 kcal/ ml) και εμπλουτισμένα με μίγμα φυτικών ινών και πρεβιοτικές ίνες μέσω καθετήρα/στομίας.
4. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής ισο- θερμιδικά (1 kcal/ ml) και εμπλουτισμένα με μίγμα φυτικών ινών και πρεβιοτικές ίνες, μέσω καθετήρα/στομίας. .
5. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής, υπερπρωτεϊνικά για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαμηλά σε υδατάνθρακες (<40%) εμπλουτισμένα με μίγμα φυτικών ινών **ΚΑΙ/Η ΜΕ ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ** Να είναι πλούσια σε μονοακόρεστα, να περιέχουν ιχθυέλαια και αντιοξειδωτικά μέσω καθετήρα/στομίας.
6. Πολυμερή υγρά διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με (>1kcal/ml) για ασθενείς με ηπατοπάθεια, χαμηλά σε πρωτεΐνη, εμπλουτισμένα με αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσού μέσω καθετήρα/στομίας.
7. Ισοθερμιδικό ημιστοιχειακό /πεπτιδικό εντερικό διάλυμα σε υγρή μορφή για χρήση μέσω καθετήρα, χαμηλής ωσμωτικότητας $\leq 230\text{mOsm/l}$, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's, (τουλάχιστον 70% του συνόλου του λίπους) και χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, για ασθενείς με δυσασπορρόφηση και μειωμένη νεφρική λειτουργία μέσω καθετήρα/στομίας..

8. Πλήρες πολυμερές ισοθερμιδικό διάλυμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης, χαμηλής ωσμωτικότητας, ελεύθερο φυτικών ινών, εμπλουτισμένο με αργινίνη, $\omega 3$, γλουταμίνη και νουκλεοτίδια για μετεγχειρητικούς ασθενείς και ασθενείς με υψηλό μεταβολικό στρες μέσω καθετήρα/στομίας..
9. Σάκοι αναμείξεως διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής 3 λίτρων
10. Σάκοι αναμείξεως διαλυμάτων εντερικής διατροφής 1 λίτρου
11. Συσκευές σίτισης με βαρύτητα