

**Οδηγίες για εργαζόμενους σε Σώματα Ασφαλείας ή σε Δομές Υγείας
Πρώτης Υποδοχής, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με νεοεισερχόμενα άτομα
χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα
- Αιμορραγικός πυρετός Ebola -**

- **Σελίδα 2:** Κατηγορίες κινδύνου
- **Σελίδα 3:** Οδηγίες για εργαζόμενους σε Σώματα Ασφαλείας
- **Σελίδα 4:** Οδηγίες για Επαγγελματίες Υγείας Δομών Υγείας Πρώτης Υποδοχής

Κατηγορίες κινδύνου έκθεσης στον ιό Ebola για εργαζόμενους, οι οποίοι
έρχονται σε επαφή* **με νεοεισερχόμενα άτομα**
χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

Ελάχιστος κίνδυνος

Επαφή* με άτομο με:

πρόσφατη (<21 ημέρες) προέλευση από επηρεαζόμενες περιοχές** (έως 10/9: Γουινέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Νιγηρία: Lagos state, Rivers state, Κονγκό: Equateur province)

Χαμηλός κίνδυνος

Επαφή* με άτομο με:

πρόσφατη (<21 ημέρες) προέλευση από επηρεαζόμενες περιοχές** (έως 10/9: Γουινέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Νιγηρία: Lagos state, Rivers state, Κονγκό: Equateur province)

ΚΑΙ πυρετό ή είναι εμφανώς ασθενής.

Υψηλός κίνδυνος

Επαφή* με άτομο με:

πρόσφατη (<21 ημέρες) προέλευση από επηρεαζόμενες περιοχές** (έως 10/9: Γουινέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Νιγηρία: Lagos state, Rivers state, Κονγκό: Equateur province)

ΚΑΙ πυρετό ή είναι εμφανώς ασθενής

ΚΑΙ αρνητικό αποτέλεσμα σε Ταχεία Διαγνωστική Δοκιμασία (RDT***) για ελονοσία.

* Ως επαφή ορίζεται η άμεση επαφή με άτομο ή η επαφή με σωματικά υγρά αυτού ή η παραμονή σε ακτίνα <1 μέτρου από αυτό

** http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/EVDcasedefinition/Pages/Ebola-affected-areas.aspx

*** Rapid Diagnostic Test for malaria

Οδηγίες για εργαζόμενους για αιμορραγικό πυρετό Ebola, κατά την επαφή*
με **νεοεισερχόμενα άτομα** χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα
- **ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** -

* Ως επαφή ορίζεται η άμεση επαφή με άτομο ή η επαφή με σωματικά υγρά αυτού ή η παραμονή σε ακτίνα <1 μέτρου από αυτό

1 Άτομο / άτομα με πρόσφατη (<21 ημ.) άφιξη από επηρεαζόμενες περιοχές* (έως 10/9: Γουινέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Νιγηρία: Lagos state, Rivers state, Κονγκό: Equateur province);

* <http://bit.ly/1ClveyR>

1 Ερώτηση για πυρετό & αναγνώριση ατόμου/ατόμων που είναι εμφανώς ασθενή

2 Εκτίμηση από
Επαγγελματίες Υγείας

Επικοινωνία με
ΚΕΕΛΠΝΟ (210-5212054)

2 Κατά δήλωση πυρετός ή εμφανώς ασθενής:
απομόνωση ή σε απόσταση >1 μέτρου από άλλα άτομα.
Αν ο ασθενής βήχει, συστήνεται να του χορηγηθεί χειρουργική μάσκα.

2 Διατήρηση των συνταξιδιωτών του ασθενούς συγκεντρωμένων σε ξεχωριστή ομάδα, μέχρι τη λήξη της ιατρικής εκτίμησης / καταγραφής

Κατηγορίες κινδύνου & Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ):

1 Ελάχιστος κίνδυνος: γάντια, χειρουργική μάσκα.

2 Χαμηλός κίνδυνος: γάντια, χειρουργική μάσκα.

Αν ασθενής με βήχα, εμέτους ή διάρροια: τήρηση απόστασης >1 μέτρου. Σε απόσταση < 1 μέτρου, να χρησιμοποιείται επιπλέον και οφθαλμική προστασία (π.χ. γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

Επικαιροποίηση: 10 Σεπ 2014

Οδηγίες για εργαζόμενους για αιμορραγικό πυρετό Ebola, κατά την επαφή*
με νεοεισερχόμενα άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -

* Ως επαφή ορίζεται η άμεση επαφή με άτομο ή η επαφή με σωματικά υγρά αυτού ή η παραμονή σε ακτίνα <1 μέτρου από αυτό

1 Ασθενής με πρόσφατη (<21 ημ.) άφιξη από επηρεαζόμενες περιοχές* (έως 10/9: **Γουινέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Νιγηρία**: Lagos state, Rivers state, **Κονγκό**: Equateur province);

* <http://bit.ly/1ClveyR>

1 Θερμομέτρηση, Ιατρική εκτίμηση, Επιδημιολογικά κριτήρια
Επικοινωνία με ΚΕΕΛΠΝΟ (210-5212054) για την εκτίμηση με βάση ορισμό κρούσματος

2 Άτομο υπό διερεύνηση για αιμορραγικό πυρετό Ebola: Απομόνωση ή σε απόσταση >1 μέτρου από άλλα άτομα & χειρουργική μάσκα στον ασθενή επί παρουσίας βήχα

2 Θετική ταχεία δοκιμασία για ελονοσία (RDT)
- Επικοινωνία με ΚΕΕΛΠΝΟ (210-5212054)

1 Θετική ανταπόκριση σε ανθελονοσιακή θεραπεία & υποχώρηση πυρετού - Επικοινωνία με ΚΕΕΛΠΝΟ

3 Αρνητική δοκιμασία για ελονοσία (RDT)
Πιθανό κρούσμα – Απομόνωση
- Επικοινωνία με ΚΕΕΛΠΝΟ
- Διερεύνηση και καταγραφή επαφών
- Επικοινωνία με ΕΚΕΠΥ
- Διακομιδή σε Νοσοκομείο Αναφοράς

1 Ελάχιστος κίνδυνος: γάντια, χειρουργική μάσκα.

2 Χαμηλός κίνδυνος: γάντια, χειρουργική μάσκα. Αν ασθενής με βήχα, εμέτους ή διάρροια: σε απόσταση < 1 μέτρου, να χρησιμοποιείται επιπλέον και οφθαλμική προστασία (π.χ. γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

3 Υψηλός κίνδυνος: γάντια, χειρουργική μάσκα, οφθαλμική προστασία (π.χ. γυαλιά ή ασπίδα προσώπου), αδιάβροχη ποδιά.